

10. PROTÉZIS, MŰFOGSOR



Van teljes és részleges protézis. Teljes protézis akkor készül, ha a szájban már nincsenek saját fogak.

Segítségével visszaállítható a megfelelő rágó funkció és az esztétikai hatás.

Részleges protézis akkor készül, ha a páciensnek van saját foga, de nem megfelelő számú, vagy elhelyezkedésű, így híd készítésére nem alkalmas. Ha nincsenek nagyőrlők, a rágó funkció visszaállítása miatt kell részleges protézist készíteni.

1, EGÉSZÍTSD KI A TÁBLÁZATOT! MIT TUDSZ A PROTÉZISEKRŐL?

TELJES PROTÉZIS	
RÉSZLEGES PROTÉZIS	

A műfogsor/protézis készítése:

- ❖ Első alkalommal a fogorvos mindkét állcsontról tájékozódó lenyomatot vesz.
- ❖ A következő alkalomra a fogtechnikus egy saját lenyomatkanalat készít. Ennek segítségével a fogorvos precízebb lenyomatot tud venni. Ebben az ülésben következik a harapási magasság beállítása.
- ❖ A következő alkalommal a viaszba helyezett fogakat kell próbálni. Ilyenkor még lehet módosítani a fogak nagyságán, állásán, formáján, a páciens igénye szerint.

A teljes folyamat hossza a lenyomatvételtől számítva körülbelül két hét.

A kész fogsor átadásával a kezelési sor még nem ér véget. Egy új fogsor törhet, fájhat, akár billeghet is, ez normális jelenség, nem szabad megijedni.

A fogsor átadása után fogsor korrekcióra kell megjelenni, ahol a szükséges igazítások elvégezhetőek.

1.alkalom	Státuszfelvétel, röntgenfelvétel, szájvizsgálat
2.alkalom	Lenyomat az egyéni kanálhoz
3.alkalom	Lenyomat a kivehető protézishez
4.alkalom	Harapásrögzítés, harapási magasság beállítása, fogszín kiválasztása
5.alkalom	Fogpróba
6.alkalom	Kész fogsor átadása

2, TEDD A MONDATOKAT EGYES SZÁM ELSŐ SZEMÉLYBE (ÉN...)!

A fogorvos felveszi a státuszt. (felveszem)

A fogorvos mindkét állcsontról tájékozódó lenyomatot vesz. (veszek)

A fogtechnikus egy saját lenyomatkanalat készít. (készítek)

A fogorvos precízebb lenyomatot tud venni. (tudok venni)

A harapási magasságot beállítja a fogorvos. (beállítom)
